

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) เป็นโรคติดต่อชนิดรุนแรงประเภทหนึ่งที่มีระบาดหนัก ในช่วงฤดูร้อน สามารถติดต่อมายังคนได้โดยสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดที่เป็นพาหะ ซึ่งมีเชื้อไวรัสชนิดนี้ในน้ำลาย เช่น สุนัข แมว หนู บริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลกัด ข่วน หรือเลีย โดยเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะแพร่กระจายไปตามเส้นประสาท และจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วเมื่อ



การทำงาน ต่างๆ ของร่างกายผิดปกติ ทั้งนี้หากผู้ป่วยถูกสุนัขกัดหรือถูกแมวข่วนแล้วไม่รีบไปพบแพทย์ บ่อยครั้งเชื้อไวรัสเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระจายไปทั่วสมองและกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยจะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ และแสดงอาการคลุ้มคลั่ง ดุร้าย ร่วมกับมีอาการชัก หายใจระทึก จนหมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

วิธีป้องกันสัตว์เลี้ยงของเราให้ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวที่เลี้ยงไว้ทุกตัวตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป และต้องฉีดให้ทุกปี ส่วนวิธีระวังตัวเอง และคนใกล้ชิดจากโรคพิษสุนัขบ้าก็คือ อย่าเล่นกับน้องหมาหรือน้องแมวที่ไม่รู้จัก เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรือเปล่า แต่ถ้าพลาดพลั้งถูกสุนัข แมว กัด เลีย หรือข่วน ให้รีบปฏิบัติดังนี้

1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสบู่หลายๆครั้ง แล้วทาแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ เช่น ทิงเจอร์ไอโอดีน แอลกอฮอล์แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. หากสุนัขที่กัดเป็นสัตว์ในบ้าน ให้ขังไว้สังเกตอาการ 10 วัน หากสุนัขตายให้ตัดหัวส่งไปตรวจที่สถาน เล่าวกา หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งศูนย์ชันสูตรโรค ส่วนในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ ให้ถือไว้ก่อนว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงควรรีบไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการด่วน